FAC SIMILE
Istruzioni per l'uso

ENTEROSGEL®

Sospensione orale

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Conservare il foglietto illustrativo perché contiene avvertenze importanti di cui si dovrebbe tenere conto nell'assunzione di questo prodotto. Potreste avere bisogno di consultarlo nuovamente.
Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio medico o al farmacista.

1. Cos'è Enterosgel® e a cosa serve?

Enterosgel® è un innovativo adsorbente intestinale (enterosorbente) che agisce nel tratto digerente, dove lega le tossine, le sostanze nocive, gli agenti patogeni e gli allergeni e li rimuove dal corpo.
Enterosgel® costituisce un idoneo trattamento complementare nelle forme morbose associate a diarrea.

Enterosgel® si somministra ad adulti e bambini nei seguenti casi:

- gastroenterite acuta (malattia associata a diarrea) in adulti e bambini
- malattie allergiche con sintomi gastrointestinali in adulti e bambini
- Sindrome dell'Intestino Irritabile (IBS) associata a diarrea.

Modalità d'uso consigliata

Adulti e bambini oltre i 15 anni: 15–22,5 g 3 volte al giorno (15 g = 1 cucchiaio)
Bambini di età compresa tra 7 e 14 anni: 10 g 3 volte al giorno (10 g = 2 cucchiaini)
Bambini di età compresa tra 1 e 6 anni: 5 g 3 volte al giorno (5 g = 1 cucchiaino).
Si consiglia di bere liquidi in quantità sufficiente (200 ml per adulti e bambini sopra i 7 anni, 50–100 ml per i bambini di età compresa tra 1 e 6 anni).
Un sufficiente apporto di liquidi è in ogni caso necessario come parte del trattamento di base della diarrea.



Assumere il prodotto 1 o 2 ore prima o dopo i pasti o l'uso di medicinali.

Avvertenze

Enterosgel® può influenzare l'assorbimento di alcuni medicinali somministrati per via orale. Usare Enterosgel® 1–2 ore prima o dopo l'assunzione di farmaci.
Se state assumendo dei medicinali potete chiedere consiglio al vostro medico o al farmacista riguardo all'uso di Enterosgel®.

Controindicazioni

Atonia intestinale, occlusione intestinale, intolleranza al prodotto accertata in base a precedente utilizzo.

Gravidanza e allattamento

Enterosgel® può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

Possibili effetti indesiderati

Nausea, vomito, stitichezza.

2. Informazioni aggiuntive

Composizione

Polimetilsilossano Poliidrato (PMSPI) 70 %, acqua purificata 30 %.
Enterosgel® non contiene zuccheri, dolcificanti, lattosio, glutine, grassi, coloranti, aromi e conservanti.

Confezione

Sospensione orale in tubo da 225 g.

Avvertenza

Agitare accuratamente il tubo prima dell'uso. Quando Enterosgel® viene erogato dal tubo può fuoriuscire una piccola quantità di liquido.

Conservazione

Conservare ad una temperatura compresa tra 4 °C e 25 °C. Proteggere dal gelo.
Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
Evitare che il prodotto si secchi dopo l'apertura della confezione.
Utilizzare il prodotto entro 30 giorni dall'apertura del tubo.

Scadenza

Vedere la data riportata sulla confezione.

Istruzioni in caso di danneggiamento della confezione

Non utilizzare se la confezione è danneggiata.

PAP

Fabbricante:

Bioline Products

Bioline Products s.r.o., Krakovská 1338/10,
110 00 Praga 1, Repubblica Ceca
tel./fax: + 420 266 317 783
e-mail: info@enterosgel.eu
www.enterosgel.eu

Distributore esclusivo per l'Italia:

GUNA
terapie d'avanguardia

GUNA S.p.a. - Milano
www.guna.it

Via Palmanova, 71 - 20132 Milano
tel.: +39 02 280181, e-mail: info@guna.it

Ultima revisione del testo: *29 aprile 2016*

Spiegazione dei simboli grafici sulla confezione:

Data di scadenza

Codice lotto

Fabbricante

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso

Condizioni di conservazione

Marcatura CE

Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso

La confezione è destinata al riciclaggio

Contributo per il riciclaggio

Informazioni utili sul meccanismo d'azione del dispositivo medico Enterosgel®

Il tratto digerente riveste un ruolo importante nel mantenimento della salute in quanto:

- metabolizza le sostanze nutritive necessarie all'organismo;
- è una delle vie attraverso cui il corpo espelle le sostanze nocive e le tossine;
- agisce da barriera e riveste una funzione immunitaria.

Cause di disturbi e sintomi

Un'invasione massiccia di agenti infettivi, tossine, allergeni e xenobiotici (pesticidi, radionuclidi, sali di metalli pesanti e simili) nel tratto digerente porta allo sviluppo di infezioni gastriche ed intestinali, di intossicazioni e di reazioni allergiche. Il funzionamento dell'organismo è accompagnato dall' insorgenza di metaboliti nocivi e tossici. Parte di essi raggiunge l'intestino, da dove viene generalmente eliminata con le feci. Alcune sostanze nocive possono essere riassorbite nel torrente sanguigno, trasportate di nuovo al fegato e rimanere nella circolazione enteroepatica.

ENTEROSGEL®

Dispositivo medico CE 1023

ZP/IT/NEW/1