



ENTEROSGEL®

Agente detossificante

Adsorbente gastrointestinale indicato per il trattamento della diarrea acuta e della Sindrome dell'Intestino Irritabile con diarrea

COSA È CONTENUTO IN QUESTO FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

1. Cos'è ENTEROSGEL® e a cosa serve
2. Cosa bisogna sapere prima di assumere ENTEROSGEL®
3. Come assumere ENTEROSGEL®
4. Possibili effetti collaterali
5. Come conservare ENTEROSGEL®
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. COS'È ENTEROSGEL® E A COSA SERVE

ENTEROSGEL® è una sospensione orale indicata per:

- il trattamento sintomatico della diarrea acuta
- il trattamento della Sindrome dell'Intestino Irritabile con diarrea (IBS-D)

ENTEROSGEL® è un adsorbente intestinale orale (enterosorbente) composto da un minerale organico, in grado di adsorbire nell'intestino alcune sostanze tossiche e nocive (per es. endotossine e enterotossine), che lega fisicamente sulla propria superficie, riducendo la frequenza dei movimenti intestinali e la durata della diarrea.

ENTEROSGEL® viene eliminato attraverso le feci, rimuovendo le tossine e le sostanze nocive adsorbite, con effetti benefici nel trattamento delle condizioni indicate.

ENTEROSGEL® nei casi di Sindrome dell'Intestino Irritabile con diarrea (IBS-D) allevia i sintomi di: diarrea, dolori addominali, gonfiore addominale e urgenza all'evacuazione.

ENTEROSGEL® non contiene conservanti, glutine, zucchero, dolcificanti, lattosio, grassi, aromi, ingredienti di origine vegetale o animale.

2. COSA BISOGNA SAPERE PRIMA DI ASSUMERE ENTEROSGEL®

NON USARE ENTEROSGEL® (CONTROINDICAZIONI):

- se si stanno assumendo medicinali a rilascio modificato per via orale
- nel caso di atonia intestinale o di occlusione intestinale (stitichezza grave dovuta a ostruzione intestinale)
- in caso di intolleranza al prodotto accertata durante un precedente utilizzo

Avvertenze e precauzioni

- Non assumere ENTEROSGEL® meno di due ore prima o dopo aver assunto farmaci per via orale. ENTEROSGEL® può interferire con l'assorbimento di alcuni farmaci somministrati per via orale. Se state assumendo farmaci, chiedete consiglio al vostro medico o al farmacista prima di assumere ENTEROSGEL®.

- In caso di diarrea prolungata, prima di assumere ENTEROSGEL®, è necessario consultare il medico per una corretta diagnosi della condizione di partenza.
- Nei bambini, nel trattamento della diarrea, è consigliabile accompagnare la somministrazione di ENTEROSGEL® con adeguata quantità di liquidi, eventualmente di soluzione reidratante orale, per prevenire fenomeni di disidratazione.
- Negli adulti si consiglia, durante il trattamento con ENTEROSGEL®, l'assunzione di liquidi o di soluzione reidratante orale al fine di garantire una corretta idratazione.
- Non superare il periodo di trattamento consigliato e non assumere ENTEROSGEL® contemporaneamente ad alimenti per non interferire con l'assorbimento di vitamine o di sostanze nutritive.
- Se la diarrea dura più di 2 giorni, è necessario consultare il medico.
- In presenza di febbre, sangue nelle feci, sintomi di disidratazione, 6 o più evacuazioni nelle ultime 24 ore, diarrea e vomito, oppure dolori addominali forti e persistenti, consultare il medico, soprattutto se si tratta di bambini.
- Non superare le dosi consigliate e non superare il periodo di trattamento consigliato.
- Consultare il medico se si stanno assumendo altri adsorbenti intestinali, per esempio preparati che contengono carbone attivo, argilla o caolino. Il medico potrebbe consigliare di non utilizzarli contemporaneamente a ENTEROSGEL®.
- ENTEROSGEL® non è indicato per l'uso in caso di intossicazione chimica acuta o sovradosaggio di farmaci.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

ENTEROSGEL® può essere assunto anche durante la gravidanza e l'allattamento. Si consiglia di consultare il medico in caso di malessere durante la gravidanza o l'allattamento. Consultare il medico prima di assumere ENTEROSGEL®.

3. COME ASSUMERE ENTEROSGEL®

- Assumere le dosi necessarie di ENTEROSGEL® appena si osservano feci molli.
- Assumere ENTEROSGEL® almeno 2 ore prima o dopo l'assunzione di farmaci per via orale.
- Assumere ENTEROSGEL® almeno 1-2 ore prima o dopo il pasto.
- Diluire la dose di ENTEROSGEL® in acqua a temperatura ambiente, prima della somministrazione.
- Agitare bene il tubo prima dell'apertura e prima di ogni utilizzo.
- Utilizzare il tubo entro 30 giorni dall'apertura.



Età	Dosaggio	Frequenza
Fino a 1 anno	2,5 g (circa mezzo cucchiaino) da diluire in 7,5-15 ml di acqua	3 volte al giorno
1-6 anni	5 g (circa 1 cucchiaino) da diluire in 50-100 ml di acqua	3 volte al giorno
7-14 anni	10 g (circa 2 cucchiaini) da diluire in 50-100 ml di acqua	3 volte al giorno
15+ e adulti	da 15 g a 22,5 g (circa 1 cucchiaino) da diluire in 200 ml di acqua	3 volte al giorno



Dimensioni della confezione

- ENTEROSGEL® sospensione orale
- Tubo 225 g
- Tubo 90 g
- Bustina 15 g (10 bustine per confezione)

Durata del trattamento con ENTEROSGEL®

- 3-5 giorni in caso di diarrea acuta.
- Fino a 30 giorni nei casi di Sindrome dell'Intestino Irritabile con diarrea, con un intervallo tra un ciclo di trattamento e l'altro di almeno 3 giorni.
- Consultare il medico prima di somministrare a bambini di età inferiore ai 3 anni.
- All'inizio del trattamento (Giorno 1) è possibile raddoppiare la prima dose e poi continuare con una singola dose dopo ogni evacuazione, fino ad un massimo di 8 dosi nella prima giornata.
- Durante il trattamento della diarrea cronica è possibile adattare il dosaggio in base alla consistenza delle feci e alla frequenza delle scariche diarroiche.
- La somministrazione può essere aumentata a 2 dosi, fino a 3 volte al giorno, in caso di feci liquide o ridotta a 1 dose al giorno, se la consistenza delle feci è normale. È possibile assumere un massimo di 6 dosi al giorno.
- Interrompere il trattamento con ENTEROSGEL® se non si hanno evacuazioni per 1-2 giorni; aumentare l'assunzione di acqua e riprendere il trattamento dopo la successiva evacuazione

4. POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI

Stitichezza, nausea.

5. COME CONSERVARE ENTEROSGEL®

- ENTEROSGEL® non deve essere utilizzato dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare ENTEROSGEL® a una temperatura compresa tra 4°C e 30°C.
- Proteggere dal gelo.
- Non esporre a eccessivo calore né alla luce diretta del sole.
- La data di scadenza riportata sulla confezione si riferisce al prodotto integro correttamente conservato.

Bustine

- Ogni bustina può essere utilizzata una sola volta dopo l'apertura.
- Le bustine sono monouso e vanno aperte immediatamente prima dell'utilizzo.
- Non riutilizzare le bustine parzialmente usate onde evitare la contaminazione microbica.

Tubo

- Dopo l'apertura e dopo ogni utilizzo richiudere bene il tappo del tubo per evitare l'essiccazione e la contaminazione microbica del prodotto.

Quando ENTEROSGEL® viene erogato dal tubo può fuoriuscire una piccola quantità di liquido.

6. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE E ALTRE INFORMAZIONI

Composizione: Polimetilsilossano Poliidrato (idrogel dell'acido metilsilicico) 70 %, acqua purificata 30 %.

SMALTIMENTO

Non ci sono misure particolari per lo smaltimento di ENTEROSGEL® non utilizzato. Il prodotto può essere gettato senza rischi nei rifiuti domestici. La confezione può essere riciclata.

Scadenza: fino alla data riportata sulla confezione.

Per eventuali ulteriori domande sull'utilizzo di ENTEROSGEL® potete rivolgervi per e-mail a: info@enterosgel.eu.

Il presente foglietto illustrativo è disponibile anche in altre lingue sul sito www.enterosgel.eu.

FABBRICANTE:



Bioline Products s.r.o.
Krátkovská 1338/10,
110 00 Praga, Repubblica Ceca
www.enterosgel.eu

Distributore esclusivo per l'Italia



Guna S.p.a.
Milano, Italia
www.guna.it

DATA DELLA VERSIONE AGGIORNATA DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO:
08.08.2022

VERSIONE: TUV/IFU/IT/NB/3

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLICI GRAFICI SULLA CONFEZIONE:

	Non riutilizzare		Dispositivo medico certificato
	Data di scadenza		Gettare la confezione usata nell'apposito contenitore per i rifiuti.
LOT	Lotto		Astuccio di carta (PAP 21). Raccolta differenziata.
	Fabbricante		Per questo imballaggio è stata pagata una commissione a un'azienda autorizzata alla gestione degli imballaggi.
	Leggere le istruzioni		Conservare al riparo dalla luce diretta del sole
	Intervallo di temperatura		Forest Stewardship Council

CE 0123

Dispositivo medico di classe IIa